


R02303-U

e 0,2l

Nr. Lot/A se consuma de preferință, înainte de: vezi capac.

9062300133933

**ORS 200 Măr**

Soluție de Rehidratare Orală pe bază de măr, gata preparată. Aliment destinat unor scopuri medicale speciale (dietă echilibrată); pentru regimul dietetic al bolilor diareice la sugari.

Valori nutriționale medii	per 100 ml	per sticlă
Valoare energetică kJ/kcal	53/12	107/25
Grăsimi	0,06 g	0,12 g
- din care acizi saturați	0,0 g	0,0 g
Glucide	3,0 g	6,0 g
- din care zaharuri	1,6 g	3,2 g
Proteine	0,02 g	0,04 g
Sare	0,35 g	0,71 g
Sodiu	141 mg	282 mg
Potasiu	80 mg	160 mg

Ingrediente: apă, suc de mere din concentrat de suc de mere 16%, malto-dextrină, sare de masă iodată (sare de masă, iodat de potasiu), citrat de potasiu, corector de aciditate acid citric.

Depozitați la temperatura camerei. **Agi-
tați bine înainte de utilizare.** A se con-
suma rece. Cantitatea rămasă se păstrează
în sticla închisă la frigider și se consumă în
24 ore. Vă rugăm să verificați integritatea
sticlei înainte de utilizare. Sigilat în vid -
capacul produce un zgomot atunci când
este deschis pentru prima dată.

Hipp Austria GmbH, A 4810 Gmunden/Austria. Distribuitor: DR MAX SRL, Str. Aeroportului nr. 53, Mogoșoaia, Ilfov-România, Tel: 021/3017474 / Maresi Foodbroker SRL, Str. 9 Mai nr. 3, Arad, Tel. 0257/281177 / HiPP România, Tel: 021/2529211, www.hipp.ro

DE LA
LUNI

HiPP

ALIMENT DESTINAT UNOR SCOPURI MEDICALE SPECIALE

ORS 200 Măr

GATA PREPARAT

conține
**INGREDIENTE
NATURALE**



**fără adaos de lactoză și fără adaos
de proteină din lapte, fără gluten**

Informații importante: Aliment destinat unor scopuri medicale speciale pentru regimul dietetic al bolilor diareice la sugari cu vârsta mai mare de 6 luni. Este un produs gata de utilizare, ce conține ingrediente naturale și săruri minerale, formulat pentru a reface echilibrul perturbat al apei și electroliților.

Utilizare: de la 6 luni, sub supraveghere medicală, ca parte a unei alimentații comple-
mentare echilibrate; nu se utilizează ca unică sursă de alimentație; se utilizează sub 6
luni doar la indicația medicului curant. Dacă medicul nu recomandă altfel, considerați
40-50 ml ORS/kg greutate corporală pe parcursul a 4 ore.

După rehidratarea eficientă, este inițiată realimentarea (informații adiționale pot fi găsite
pe verso). **Pierderile suplimentare de lichide cauzate de vărsături și/sau diaree
vor fi compensate prin administrarea adițională 10 ml/kg greutate corporală
(ideal cu lingurița la intervale scurte, de ex. 5 ml la fiecare 1-2 minute).**

Contraindicații: Insuficiență renală acută și cronică, alcaloză metabolică, vărsături
necontrolate, stări de șoc/alterarea stării de conștiință, malabsorbția carbohidraților,
ocluzia intestinală. Nu este recomandat copiilor cu alergii sau intoleranță la oricare
dintre ingredientele produsului. Nu este potrivit pentru utilizare parenterală.
Vă rugăm acordați atenție informațiilor regăsite pe interiorul etichetei.

ORS 200 Măr

HiPP ORS 200 Măr, aliment destinat unor scopuri medicale speciale, pe bază de suc de mere (din concentrat de suc de mere), cu săruri minerale, pentru regimul dietetic al bolilor diareice la sugari cu vârsta mai mare de 6 luni, utilizat în mod suplimentar în dieta zilnică, la recomandarea medicului și sub supraveghere medicală. Doza zilnică este recomandată de medic în funcție de vârstă, greutatea și starea clinică a sugarului.

În caz de diaree severă: Este absolut necesar să consultați medicul. HiPP ORS 200 Măr poate fi, de asemenea, folosit complementar terapiei intravenoase de înlocuire a pierderilor de lichide.

Realimentare:

Sugarii alăptați ar trebui să fie alăptați la cerere, de la început, în paralel cu administrarea HiPP ORS 200. În intervalul dintre mesele de lapte, HiPP ORS 200 se administrează în porții mici.

Copiii nealăptați mai mici de 6 luni vor primi, după etapa de rehidratare, formula de lapte obișnuită.

Copiii care au început deja diversificarea alimentației vor primi formula de lapte obișnuită și hrana pentru diversificare în cantitate și concentrație completă, după etapa de rehidratare. În cazuri severe realimentarea poate fi reluată gradual.

Copiii mai mari vor primi inițial o dietă ușoară și ceaiuri. Sucurile cu un conținut crescut de zahăr (zaharoză, fructoză, sorbitol) ar trebui evitate. Dieta va reveni la normal după două până la maxim cinci zile.